



Alfa-2 antiplazmin

Gebelik sırasında serum alfa-2 antiplazmin konsantrasyonunda hafif derecede artma olduğunu ve değişme olmadığını bildiren araştırmalar vardır.

- (↑) 56 gebe kadında yapılan araştırmada, gestasyon yaşı ile Alfa-2 antiplazmin konsantrasyonu arasında pozitif korelasyon olduğu belirlenmiştir ($r=0.27$). Hiçbir vakada referans aralık altında netice elde edilmediği halde, %14.3 vakada bulunan değerlerin referans aralığının üzerinde olduğu belirlenmiştir.

Blood coagulation and fibrinolysis during normal pregnancy. Van Wersch JWJ, Ubachs JMH. Eur J Clin Chem Biochem 1991;29:45-50.

- (↔) Gebe kadınlarda ve oral kontraseptif kullananlarda yaş ve cinsiyet açısından uyumlu kontrol grubu ile yapılan mukayesede anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir.

Determination of fast-acting plasmin inhibitor (alpha2 antiplasmin) in plasma from patients with tendency to thrombosis and increased fibrinolysis. Teger-Nilsson AC, Friberger P, Gyzander E. Haemostasis 1978;7:155-157.