



## Alfa-2 globulin

*Mevcut yayınların tamamında, gebelik sırasında serum alfa-2 globulin konsantrasyonunda yükselme meydana geldiği bildirilmektedir.*

- (↑) 27 gebenin izlenmesine dayanan araştırmada, ortalama konsantrasyonun gebelik öncesinde  $5.6 \pm 1.0$  g/L'den, 8-11. haftalar arasında  $6.1 \pm 0.8$  g/L'ye, 20-23. haftalar arasında  $6.4 \pm 0.9$  g/L'ye, 30-31. haftalar arasında  $6.9 \pm 0.6$  g/L'ye yükseldiği bildirilmiştir.

*Serum protein pattern in normal pregnancy with special reference to acute phase reactants. Haram K, Augensen K, Elsayed S. Br J Obstet Gynaecol 1983;90:139-145.*

- (↑) Son iki trimesterde artma görülür.

*Biochemical values in Clinical Medicine. Eastham RD. 4th edition, Baltimore MD, Williams and Wilkins 1971.*

*Interpretation of Diagnostic Tests. Wallach J. 3rd edition, Boston MA, Little Brown and Co 1978.*

- (↑) Gebelik boyunca 0.1 g/dL civarında artma olur.

*Serum protein changes in the preeclampsia-eclampsia syndrome. Studd JWW et al. Br J Obstet Gynaecol 1970;77:796-801.*

- (↑) Tedrici bir artma meydana gelerek, gebe olmayanlara göre 1.0 g/L civarında yükselme görülür.

*Clinical chemistry of pregnancy. Lind T. Adv Clin Chem 1980;21:1-24.*