



Fosfolipitler

Gebelik sırasında, diğer lipid fraksiyonlarında olduğu gibi serum fosfolipid konsantrasyonunda da yükselme meydana gelir.

- (↑) Gebeliğin 12. haftasından 36. haftasına kadar progressif bir artış meydana gelir. Maksimum seviyeye doğum sırasında ulaşılır.

Longitudinal study of plasma lipids and lipoprotein cholesterol in normal pregnancy and puerperium. Jimenez DM, Pocovi M, Ramon-Cajal J et al. Gynecol Obstet Invest 1988;25:158-164.

- (↑) Total fosfolipit konsantrasyonunun 250 mg/dL'den 350-400 mg/dL'ye yükseldiği bildirilmektedir.

Clinical chemistry of pregnancy. Lind T. Adv Clin Chem 1980;21:1-24.

- (↑) Gebe olmayan kadınlardan oluşan grupta ortalama total fosfolipit konsantrasyonunun 229 ± 47 mg/dL bulunmasına karşın, gebeliğinin 8. haftasında bulunan 42 kadında 199 ± 34 mg/dL bulunduğu, 38. haftada ise 323 ± 42 mg/dL'ye yükseldiği bildirilmiştir.

Correlation of hormones with lipid and lipoprotein levels during normal pregnancy and postpartum. Desoye G, Schweditsch MO, Pfeiffer KP et al. J Clin Endocrinol Metab 1987;64:704-712.