



Lenfosit sayısı (kan)

Gebelik boyunca kandaki lenfosit sayısında az miktarda düşme meydana geldiği bildirilmektedir. Ancak granülosit sayısında belirgin derecede artma meydana gelmesi nedeniyle lökosit formülünde lenfosit oranındaki düşme de belirgin derecede olur.

- (↓) 29 gebenin gebelik boyunca takip edilmesine dayanan bir araştırma sonucunda, kanda lenfosit sayısının referans aralığı birinci trimestr için (12. hafta) $0.4 - 3.2 \times 10^9/L$, ikinci trimestr için (24. hafta) $0.7 - 2.7 \times 10^9/L$, üçüncü trimestr için (36. hafta) $0.7 - 2.7 \times 10^9/L$, gebe olmayanlardan oluşan kontrol grubu için ise $1.1 - 2.7 \times 10^9/L$ olarak belirlenmiştir. Buna göre, gebe olmayan kadınlardan oluşan kontrol grubu ile mukayese edildiğinde, kanda lenfosit sayısının birinci trimestrde farklı olmadığı, ikinci ve üçüncü trimestrlerde ise %6 kadar düşük bulunmuş olduğu görülmektedir.

Lockitch G. Handbook of Diagnostic Biochemistry and Hematology in Normal Pregnancy. Boca Raton, CRC, 1993